

DOCTORIS FERDINANDI DE SOLA MEDICI HISPALEN-

sis demittendo sanguine in pleuritide
secundum Hipocratis, & Galeni
sententiam iudicium.



MAGNA FVIT CONTEN-
tio inter antiquos Medicos de san-
guine mittendo impleuritide scili-
cet, ex qua parte fieri debeat, græ-
ci fere omnes ex eadem affirmantes
Arabes autem ex contraria, sed re-
centiores facta vtriusque curatio-
nis experiētia barbarorum opinio-
nem tanquam pernitiosam explo-
derunt multi tamē iudicātes se alicuius noui esse factores,
(quod iam relictum est:) iterum ad arenā redeūt, sic mo-
do quidam Medicus Hispalensis repugnantibus reliquis
hāc defendere opinionē conatur cuius rationes hāc sunt.

Prima existente vulnero in uno latere ex altero mitti-
mus sanguinem reuulsionis gratia, nam ex eodem magis
concitaretur fluxus ergo similiter impleuritide, patet ea-
dē est ratio vtriusque quia sicuti in primo casu reuelimus
sic & in altero.

Secūda eadem est ratio præcautionis & curationis, sed
in præcautione sanguinem mitimus ex opposito latere,
reuulsionis gratia ergo, & in curatione, probatur eadem
causa quæ incepta foget affectum eundem eficit cōtinua-
ta, sed sic se habet ubi timetur fluxus, & ubi iam fluit ergo,
sicuti in primo casu ex latere oposito debet fieri sic & in
secundo casu.

Tertia Galenus multis in locis docet, quod longissi-

A me

me a parte inflammata est abocandus humor, sed missio sanguine ex proprio latere non remouetur, sed potius atrahitur ergo nullo modo est facienda.

Quarto in omni inflammatione facienda est fluxus in principio, ergo in omni inflammatione in principio est rebelendum, sed ex proprio latere reuulsio fieri non potest ergo ex opposito est exercenda, probatur reuulsio est ad vocatio humorum contrario motu quem habet, sed sanguinis missio ex proprio latere non dat humoribus contrarium motum, ergo non sit ex eo reuulsio.

Quinto reuulsio si cognoscitur origo fluxionis ad originem fluxionis est exercenda, sed vena caba fere semper est origo fluxionis, siquidem fere semper tota massa sanguinaria prius putreficit, & ex putrefactione separat natura, quod inflammationem causat, ergo ad ipsam venam cauam est revocanda fluxio, sed id non sit ex proprio, sed ex opposito latere ergo semper ex eo est exercenda reuulsio.

Aucto. Auctoritatibus etiam hanc suam fulcire possumus opinionem, i.e. ex Hippocrate secundo de natura humana, ubi afferit longissime & in contrarium aparte inflammatu auctorando esse humores, & Galenus 13. methodi, ubi docet quod laborante manu crus scharificetur, id etiam multis in locis ait & Celsus lib. 2. cap. 11. humero laborante reliquum scharificare censet, idem iudicat Aetius radem inter omnes ut magnus, Achilles ab eis Aunicena proponitur, tuis tota tribuitur invenio iste autem lib. 3. fem. 10. trah. q. cap. 1. in pleuritide & aliis internis inflammationibus iubet secare venam in maleolo contrario in longitudinem, & postea in brachio contrario ultimo ex proprio iprimo quando plenitudo est magna, ut sit ex maiori distensione excrure quando tanta non est ex contrario brachio hec sunt rationes & autoritates quibus hic magnus inuentor a consortio medicorum separatur.

Notād. Sed ut in hac difficultate que maxima & necessarissima pro humana saluti est, certa ab incertis separemus, aliqua sunt notanda, & presuponenda, & primum erit, quod omnis

omnis methodica cūratio debet procedere indicationibus, & quod si simplex sit morbus, simplici indicatione curatur, si vero compositus composita, & similiter quod in uno morbo est duplex indicatio, vna quæ summitur a causa alia vero ab ipso affectu.

Secundo aduertendum est, quod in indicationibus cōplatis hic seruatur ordo, quod ad vrgenciorem consilium curantis prius aplicetur, & si sint equeales, ad id quod habet cause rationem & conditionis sine qua non, & in morbo cum causa prius a causa postea ad ipsum id metho dicē procedēdo, nam si aliquis vrget ad vrgenciorem vt dixi & si equaliter ad omnes equaliter.

Tertio aduertendum est, quod causa tripliciter nobis indicat, ex se primo ex motu ad aliquam partem, & tunc ex postulat reuulsionē, quæ in cōtrarium fit, secundo ex modo motus vt si parum fluit & iā est flucxa et tūc ex postulat deriuationē, tertio quando iam est flucxa et tunc ex postulat a parte separationem, quæ dicitur euacuatio.

Quarto aduertendum est, pleuritidem morbum esse constantem ex duplice causæ motu exfluente quæ dicitur antecedens, & ex flucxa quæ in mediate fouet affectu & dicitur coniuncta: & quod ratione huius vltimè scilicet coniunctæ omnia signa quinque pæctonomonica pleuritis, si vera est, sub boriuntur: nam febris in hoc morbo (vt ab ea incipiamus) accidentalis est dependens apudtrefacione cause coniunctæ & non apudtrefacione facta in vena caba, quod ex eo patet: quia vrina est optima, quod non esset si apudtredine totius dependeret, quod aduertit Hipocrates in prognosticis, & confirmat Galenus tertio epidemiæ seccione secūdate x. 6. cū ait vrina bona in pleuriti de non est bonū nec malum mala, vero malū: quia primum nō ostēdit, quod est in parte inflamata, cuius ratione sit morbus, secundum vero ostendit morbi cōplicationē, quod malū est, vnde cōstat falsū esse afferere sēper apudtredine facta in vena caua procedere pleuriticā inflamationē similiter dolor ex humore fluxo cōcitatur, quia

foluet cōtinuū excitando tumōrē & tensionē in pleura, cuius rations resultat difficultas respirationis, tussis que ex eo quod resudat ex cōiuncta causa pulmoni que cōmunicatur, prouenit, quod quando maximē liquidum est, dilabitur & non ex puitur, aut quando crassissimum quia expeli non potest, ferrinus tandem pulsus expleure tensionē sit, propter quod arteriæ redundunt tensiæ distentat tunica intro eas vestiente quæ vna cū pleura est.

Quinto notandum est, omnes evacuationes tan reuulsorias, quā euacuatorias fieri debere secūdū rectum, quia sic magnifice pro sunt, cōtrariæ vero nocēt euacuata materia quam euacuari non debebat nocentem in corpore relixtam, quod Hipocrates affirmat. 6. Epidemie Sec. 2. tex. 12. 13. 14. & 15. & Galenus libro de Sanguinis missione cap. 15. 16. & 17. & 5. Methodi cap. 3. & 3. discri-sibus ca. 3. & 2. ad Glauconē cap. 2. & ratio est: quia partes, quæ edirecto positæ sunt, magis inter se communicaant, & fruūtūr, ut Galenus docet 14. de vsuper partium cap. 7. & de constitutione artis mediceæ cap. 17. & libro de Rigore cap. 7. ante finē ubi hęc proponit verba, alia enim vena cum alia corporis parte cōmanionem haber, & per rectum semper evacuationes facere oportet, nā si venas nil cum affecta parte rectum habentes incideris, nec affectam partem sanabis, & sanā semper ledes, &c. Et quia id ab omnibus & ab aduersario recipitur rectitudinem seruandam esse, solis autoritatibus præsuponitur.

Sexto Aduertendum est, rectitudinem constituendam esse in sotietate partium per communes venas proxime ab eodem trunko de ductas per communia orificia communes cavitates & meatus, simul cum recto partium positu, quod vero fiat per communes vias ab omnibus unanimitate recipitur, quia si reuocatio fieri debet per easdem venas per quas sit, necessarium est, quod sint communes & inter se cōnectedæ: sed quod hoc non sufficiat, & simul sit necessarium quod communicent per orificia cavitates & meatus occultos, ex eo patet, quod sanguinis missio ex latere

tere sinistro in inflāmatione iecoris, aut fluxus sanguinis
ex nare sinistro reprobatur, quia nō est secūdū rectū, & sit
per communes venas, quia equaliter ab eodem iecore di-
stribuūtur & distant, non sufficit ergo quia riquiritur am-
plius ad rectitudinem, & quod hoc totum non sufficiat si-
ne recta partium positione probatur ex eo quod Saphena
exterior scisa maioris iuuamenti est in sciatica quam in
terna, & tan vna quam altera seruat vasorum communita-
tem, per communes venas orificia & occultos meatus, sed
non est eadem positio partis, nam magis recta est exte-
rior quam interna, & ideo magis prodest, quod optime
docet Hipocrates 6. Aphoris 36. & confirmat Auicena
fen. 4. lib. 1. cap. 20. ante finem cum ait & ratio quidem
facit oportere vt Saphena & sciatica sint eiusdem iuuamē-
ti, sed experimentum facit vt operatio sciaticæ plurimū
cōueniat dolori sciaticæ, & illud est propter aspectū eius
&c. ex quo patet rectitudinem tantopere ab Hippocrate
Galen & reliquis decantatam in hoc consistere, quod
communicent per venas & meatus & recte sin posittæ cū
parte, vnde paret quod dextrum cū sinistro brachio nul-
lum seruat cōfusum nec venarum nec partium positionē
nec meatū parer, quia communicatio est, quando orifi-
cia venarum inter se oscula osculis per anasthomosim sic
dictam a Galeno communicant, & nō quia ex magno trū-
co de ducantur, quia sic omnes rectitudinem seruarent, &
non proponetur preceptum, vbi necessariū non erat, sed
posuit & celebrat, vt in omni reuulsione rectitudo ser-
uetur, ergo quia eam intelligit vt diximus destra cum de-
stris & sinistra cum sinistris, & id multis experimētis cō-
probatur vidimus quotidie a destra parte capitis de flu-
xionem podagricam prouenire, & apēde ad caput aurā
frigidam epilepsiam concitantem ascēdere, ab uno tamē
latere in aliud nullus medicorum, nec vedit, nec timeret,
nec docet, ergo quia non seruat rectitudinem, sed me-
dicus qui naturæ est imitator non contrario modo, ac
natura operatur, operari debet, nam tunc non medicus,

sed carniphex nominari possit, huc accedit maxima con-
gruentia, quæ summitur ex eo, quod natura multas dupli-
cabit partes & eas separabit, ut si vna periret, altera con-
seruaretur, ergo si vna seruari post & ledi, altera ilesa, est
quia per alias vias & occultos meatus tanca causa nocēs quā
spiritus conseruatibus ad eam peruenire potest.

Obiec.

Dicitis tamen non contrariatur quod Galenus 3. de fra-
cturis com. 10. affirmet, rebulsionem fieri debere ad ex-
tris ad sinistra, nam id in eodem latere intelligi debet, ut
videre est in capite, quod cū sit vnum est destra & sinistra
pars. Non vero latus cōtrariū intelligitur, quia dicit serua-
ta rectitudine, quæ nō seruaretur, si nō esset in eadē parte.

Secunda

Nec amplius contradicit dictis, quod aliqui affirment
in fibris rectis consistere rectitudinem, nam id falsum est
nam fibrae rectæ attrahunt, & sanguis in Phlebotomia nō
trahitur, sed expelitur cōcitata natura propter dolorem.
& ligationem factam in parte.

Tertia.

Multo minus huic repugnat rectitudo, quā noster ma-
gnus inuentor assert, sibi ut vult iudicat in corpore fluc-
tus & refluxus sanguinis, ut si sanguis esset in venis ut in
vitre aqua, non aduertens sanguinem a venis huc, & illuc
moueri a facultatibus in illis consistentibus, & quod non
potest mitti nisi ubi sit communitas & consensus requisi-
tus, ut natura assuescit, sed cū id quod est, naturā imitari
sit vere medicū. quod ad vertat oportet ad curationem.

Quarta.

Nec amplius obstat quod ait Hipocrates in libro de ali-
mento & 6. Epidemie sec. 6. tex. 1. scilicet cōfluxio vna
conspiratio vna omnia omnibus cōsciunt, quod etiam
confirmat Galenus lib. 3. de facultatibus cap. 3. & de cau-
sis pulsuum cap. 12. nam id intelligendum est ex commu-
ni consensu omnium partium (quod optime inter omnes
meo videri ostendit Stephanus Ateniensis magnus & an-
tiquus Galeni commentator, super primu[m] ad Glauco-
nem) nō vero de particulari requisito ad sanguinis mis-
sionem, quæ rectitudo dicitur ut monimus, & affirmat
Galenus libro de sanguinis missione cap. 19. in principio.

Septimq

Septimo adduertendum est, quod in reuulsione præter rectitudinem etiam requiritur contrarietas, quam optime proponit Galenus in libro de reuulsione, cū ait, quod est quadruplex supra & infra, ab intro ad extra, a dextris ad sinistra, & ante & retro, id etiā affirmat. s. meth. 3. & 5. Aphor. 68. & quod semper est seruāda aliqua cōtrarietas nō omnes simul: nā quādō fit secūdū omnes, non prodest, quia non seruat rectitudinem vt supra dicimus, & ipse Auicena licet in reliquo cecus agnouit sen. 4. lib. 1. cap. 3. ad medium cum ait non oportet quidem, vt in duas Diametros prolongationem facias, sed in vna tantum quæ sit diameter magis longinqua, nam si materia fuerit in supremo dextre partis non erit trahenda, ad infimum sinistræ & hoc est illud quod est magis necessarium &c. Reuulsio tamen propriæ diæta, semper fieri debet cū vna harum contrarietate hæc contrarietas in tam parua distâtia esse solet, vt in vna & eadē parte fieri possit & debeat secūdū variū sitū, vt V.g. quādō in capite fit reuulsio a parte anteriore ad posteriorem, fieri tamen potest in distantissima parte seruata rectitudine, vt fecit Galenus lib. artis medicæ 99. aliquando vero ad originem fluxionis, quæ magis proprie dicitur reuulsio, si cognoscatur quod elegat Galenus docet. 1. ad Glauconem 14. Origotamen fluxionis aliquando pars proxima aliquando distans est & aliquādo distantissima potest esse, in quo casu quando constat medico de origine fluxionis semper ad ipsam originem rebélere deber, quia nulla alia ratio ne cōmodius quodlibet malum potest impidiri: secundū quā doctrinā Galen. 5. Meth. 13. reuelit humores a capite ad pulmones fluentes medicamētis calidissimis capití appositis vt taspia, &c. & 3. de locis 7. antefinēm in puerō epileptico avaram frigidam acrure ad cerebrum ascendentem reuelit quidem cucurbitulas & vincula cruri aponeedo & vstitutiones, & lib. de sanguinis missione 18. in recētirenum inflamatione prius sanguinē mittit ex brachio & nō ex cruribus, quādō adest plenitudo, euā sirenæ cōstitutis in medio supernarū & infernarū partiū, quia in parti bus

bus superioribus magis redūdat sanguis, & sua nativa gra
uitate potius ad iuuatur ad descēsum, & sic videtur, quod
sit origo fluxionis & ad illam reuocandum esse sanguinē,
quando vero non constat medico de origine fluxionis,
reuulsio ad maxime distantia loca, seruata rectitudine
dicta, est exercenda, ut securius fiat, & hæc est causa
quare in affectibus capitum fricamus & abluiimus crura ad
rebelendam doloris causam, quæ doctrina debet intelli-
gi in præcautoria reuulsione, quæ fit sanitati tempore an-
te quam humores cōfluant & consuetā inflammatiōne ge-
nerent, & in hoc sensu intelligit Galenus Hipocratis sen-
tentiam lib. 2. de natura humana tex. 9. vbi ait venarum
secciones procul faciendas esse a locis in quibus sanguis
colligi & dolor excitari consuevit ut natura a suēscat hu-
mores ad alias partes trāsmittere, &c. Reuulsio tamen cu-
ratoria nō est facienda ad lōginquas sed ad oppositas tan-
tum vt docet Hip. 6. Epidemie sec. 2. comēt. 29. & 51
Aphor. 68. & libro artis medicæ 95. & in opposita parte
potest esse talis positio, vt simul fiat reuulsio & euacuatio
si affectus vrgeat, quia vbi est periculi imminentia nō vni
ca solum indicatione sed duplice est pugnandum & ratio
est, quia non solum intendimus rebelere & fluxionem si-
stere, sed id quod iam est in fluxum pro affectus genera-
tione euacuare, quo euacuato similiter fluxioni sucurred-
imus quia non solum ad causam sed ad eius principium est
accedendum, vt ait Galenus, a quo mutuatus est Auicēna
fem. 4: lib. 1. sciato quando aspergit & cū ad diuersum tra-
here volueris dolorem prius seda sedatur tamen euacua-
ta causa distendente, quæ est humor in parte contentus &
in hoc sensu debent interpretari difficultia Hipocratis ver-
ba 6. Epidemie sec. 2. tex. 8. cum inquit renitenti siste-
re id est ut Galenus aduertit in cōmentario toto fluxionis
tempore non esse remanēdum cum remedii reuulsoriis
sed interponendum esse aliquid tempus euacuationi hu-
moris pecantis & in affecta parte contenti, postea rever-
tendum esse ad auxilia reuulsoria, nam sic magis proficiēt
remedia, calorenī, & dolor, & molestia partis magis
irritant,

irritant & concitant flucxionem, & hoc præcipue habet locum in internis inflamationibus in quibus non solum intēdimus reuelere causam fluentem, sed quod flucxum est propter mortis inminētiā, quia iusta partes principes ecxistit & quia flucxionis occasio est.

His sic propositis 1. concl. quæstionis responsua propo-
nuntur, quæ sic se habet in vera pleuritide, quæ suis sit firmata
sint op̄matibus non est exercēda solum euacuatio reuulsoria,
sed simul rebelere diriuare & euacuare debemus.

Probatur concl. hæc vbi complicatæ sunt indicationes, &
omnes equaliter vrgent, si vnico remedio possumus omnibus
sucurrere, ex meth. cōstat quod fiat, sed sic se habet pleu-
ritis vera: ergo prob. ans. in pleuritide, causa, quæ fluit, indi-
cat reuulsionem, quæ iusta partem est diruationem, & quæ
flucxa euacuationem: & omnes equaliter vrgent, & magis
flucxa quia quod iam flucxum est, magis molestat: siquidē
concitat inflammationem iusta cor ergo omnibus equaliter
est sucurrendū prob. minor quod scilicet id fieri possit vnica
euacuatione, si humor trahitur ad contrariū aut ad originē
fluxionis sit reuulsio, & si sit per venas cōmunes & proximas
sit euacuatio & deriuatio simul: sed talis vena eligi potest: er-
go & fieri talis euacuatio vt infra latius probabo intertia cōcl.

Ex latere opposito nulla euacuatio fieri potest reuulsoria
deriuatoria, nec euacuatoria. Hęc et cōcl. duas habet partes
quoadvnā scilicet, quod nō deriuet, nec euacuet preterquam
quod ipsi aduersarii fatetur Gal. aperte docet lib. de sanguini-
nis missione 16. quo ad alia. s. quod nō reuelat sic prob. ab om-
nibus est receptū, & a Gal sepius de cantatū, in reuulsione rē
quiri restitudinē, sed sanguinis missio ex latere opposito nu-
llā seruat: ergo nec fieri ex illa reuulsio petest: quod eam nō
seruet prob. restitudo cōsistit in cōmunione valorū meatū,
& recto partium positū vt supra probabimus, sed in aduersa
sanguinis missione, nec est cōmunicatio vasorum (quia nō
cōmunicat nisi in origine de qua cōmunicatione nō dicitur,
quia secundū ipsam omnes communicat & non esset necessaria
aduertentia) nec positionem partium, nec meatum nō
habet: ergo nullam seruat restitudinem & per consequens,
nec ex ea fieri reuulsio potest.

Secūdo prob. reuulsio fieri debet ad originē fluxionis si cognoscatur, & si nō cognoscatur saltim vbi timetur, sed latus. oppositū nō potest esse fluxionis origo: ergo nūquā ad illud est, reuocādus humor prob. fluxiones omnes secūdū rectū exeret natura: ergo & auersiones earū fieri debet secūdū rectū: sed pars illa nō est secūdū rectū: ergo nec est origo fluxionis.

Obiectio: Sed obiecties, vno crure laborāte reliquū iubet scharificare Gal. in 13. meth. & ipse iubet, vt seruetur rectitudo ergo; aut aliud in vniuersalibus docet Gal. quam exercet aut est falsus.

Huic dubitationi respondent aliqui, Galenū falso sum assertere in presenti, & quod sibi contrariatur in vniuersalibus præceptis, quos insegni debemus, & quod nullo modo ex alio crure nisi ex brachio sanguinem mitēdum esse, sed hæc responsio non est recipienda, siquidem Gal. cōtraditionē in ponit, quod prouenit ex praua eius intelligētia & sic in hoc turpiter sunt aluçinati Auer. & mordicus Argenterius.

Et sic respondemus, duplicitate oportere vno crure laborante alterum scharificare 1. quia in inflammationib⁹ exteriorib⁹, in quibus non est maxima vrgencia, parum refert an omni modo seruetur rectitudo, 2. ne id quod a natura extra ex pulsū est, iterum ad amplas venas retrocedat, & cordi communicetur, quod si fiat ex brachio, cōtinget, quod optime aduertit Avicena quando ait, & caue, cum ad diuersum trahere volueris, ne humor transeat per membrum principale, quod maximum est absurdū quoties morbus prestat inducias, quia curatio fieri debet tuto, & non est tutum, quod est in parte inflammatā ad regionē cordis aduocare, quod sit, si ex brachio mittatur sanguis.

Obiectio: Sed dices, ergo similiter propter hoc brachio laborante crux non potest scharificari fieri, sed reliquum brachium.

Sed diuersa est ratio 1. quia sanguis a partibus superioribus ad inferiora cum maiori velocitate pertransit, cum ex sua naturali gravitate iubet natore ex pulsione, & cum non detineatur (nisi pestilens sit humor) parum nocet, contra vero quādo ab inferioribus ad superiora attrahitur humor: quia cum maxime violentetur in ultimum detinetur, in via, cuius ratione nocet brachium ramē contrarium, sciendi non debet,

quia

quia preter quā quod nō seruatur rectitudo similiter humor transit per mēbrum principale & cū maiori violencia, quia contrariatur naturē motui qui est secundū rectū, & sic intelligatur Galeni doctrina quæ verissima est.

In omni vera pleuritide, si plenitudo sit, & vires consentiant, semper scindenda est vena vasilica eiusdem lateris. Dico in concl. si vires sint sufficiētes, & plenitudo existat, nam quoquā horum deficiente, etiam si pleuritis vera existat, euacuatio non est exercenda. Prob. quia ad omnem sanguinis missionem requiritur presentia ex postulantis & consenserentis: sed ii deficiunt: ergo & talis euacuatio, id Gal. affirmat in 6. Epidem. vbi sine sanguinis missione quēdam egrotum laborantem vera pleuritide, se curasile narrat, quod etiā quando dolor paruuſt est fieri potest, ut iubet Celsus dum ait, super oacaneū esse auxiliū sanguinis missionē si leuior fuerit, pleuritis, quod etiā confirmat I ralianus, sic ne igitur teme, re sanguinē dimitas, nec purges, ut vulgo fatiunt, nisi exquisito dediceris humorē, qui inflāmationē fecerit copiosū esse & in toto corpore superare similiter Paulus, & Aetius docēt. Hæc tamen concl. quod silicet vena vasilica eiusdem lateris scindenda sit, est magni medicinæ parentis Hip. in 1. de morbis vbi de pleuritide agens hæc proponit verba, huic veniam secare conducit in manu splenitidem appellatā, aut hepatidem iusta, vtrā sane fuerit morbus, id similiter affirmat 4. acutor. 73. dum ait si dolor supra ad clabem atingerit, vel circa mammam, aut brachiū interiorem brachii venā scindere oportet ab ea parte quācūque illa fuerit. vbi est dolor, hæc, Hipoc. quid clarius id similiter Galenus in com. confirmat, & docet, ut sic reliqua Hipoc. dicta circa hoc intelligentur, id etiam docet 2. acut. 10. vbi ait in pleurica inflammatione sanguinem esse mittendum ad mutationem coloris, sed ex latere opposito etiam si totus quantus est in corpore euacues non mutabitur color; ergo ex eodem ait patet, mutatione sit quādo ecxit, quod contentū est in inflāmatione: sed id per contrariam partem non potest extirahi: ergo semper ex eodem latere est facienda ista euacuatio ab Hippo, proposita, id similiter docet Galen. 13. meth. cap. 11. & lib. de sanguinis missio

3. Concl.

* ne cap. 16. ubi postquam utriusque curationis fecit experie-
tiam, ait quoniam & pleuriticis quæ edirecto laborantis la-
teris ad hibita fuit sanguinis missio clarissimam sepe utilita-
tē attullit, quæ vero ex brachio opposito, aut omnino obscu-
rami, aut certe post temporis interualum, & non de euacua-
tione est intelligendus, vt inuentor vult, nisi de reuulsione:
similiter, quia nullus ita cecus erat, cui necessarium esset ad-
uertere, ex latere opposito euacuationem humoris existen-
tis in parte inflamata fieri debere, quia si ad reuulsionem nō
seruat rectitudinem quo modo ad euacuationem, preter quā
quod in omnibus illis locis de principio inflammationis loqui
tur, cum his tamen neoterici fere omnes conueniunt, ne tē-
pus in recitando autores conteramus frustra.

Ratione tamen prob. i. ea vena est scindenda in pleuriti-
de, quæ omnibus propositis indicationibus correspondeat,
s. quod reuelat, deriuet, & euacuet: sed ista omnibus corres-
pondet. s. Vasilica eiusdem lateris: ergo ista semper est scindē-
da, quod vero deriuet & vacuet nulli dubium est: quia est pro-
xima, & per cōmunes venas, quod reuelat, prob. trahit sanguini-
nem ad oppositum: ergo reuelit, quia reuulsio est advocatio
humorū contraria motu quæ habent, prob. trahit sanguinē ab
intro ad extra, (qui a vena ista respectu pleure est exterior li-
cet interna sit facta cōparatione ad cutē, vt locū nō habeat,
quod de variolis afferit contrariæ opinionis deffensor) & ab
inferioribus ad superiora, quia brachium superius est ratio-
ne pectoris ergo reuelit.

Secūdo prob. reuulsio exercēda est ad originē fluxionis,
sed euacuatio facta ex eodem lateri est huiusmodi ergo reuelit
prob. pleuritis fere sēper fit ex de fluxione capitī: aut ex re-
frigeratione pectoris recōcētrato sanguine ad interiora: ergo
aduocatio illius ad superiora, & exteriora trahit ad origi-
nē fluxionis, quod fit ista euacuatione, ergo semper est exer-
cēda, & etiā si pars mādans, sit vena caba, quod ex quisitum
est, vt supra probabi aduc reuelit ad eā patet sanguis, qui ecxit
ex axillari prius euacuatur ex vena caba immediate, ergo ad
eā reuocat fluxionē & per consequens semper est scindenda.

Tertio prob. in morbis curatio tuto & cito est exercenda,
sed

sed scisa ista vena curatio sit tuto, & scito, ergo ista vena est
scindenda prob. curatio sit tuto & scito in inflammacionibus,
quando causa molestas aussertur, tan fluens, quā fluxa & cum
minori virium dispendio: quia vnicas salus in his inflammatio-
nibus est virium robur ex Galeno, Sed hoc sit misso san-
guine ex eodem latere: ergo semper est mittendus, id prob. ista
vena habet maiorem cōmunitatē cū parte, ergo magis de ma-
teria in ea contenta euacuat, & est opposita ipsi parti: ergo
reuelit & cicius eficit, quod est necessarium in inflammatio-
nibus, quod tutius & securius est.

Et confirmatur id, & sit 4. argum. ea vena secari debet in
pleuritide & aliis internis inflammacionibus, quę cicius & ma-
gis reuelat & euacuet a parte affecta: sed vena vasilica lateris
affecti hoc prestat munus in pleuritide, ergo hęc & non alia
secari debet maior prob. ex Gal. 2. acutorum 10. quia pleu-
ritis sicuti alię internę inflammaciones vrget sua acutie, & peri-
culo, & nō prebet indutias, & ideo occasio remedii preceps
est, & dilatatio periculosa, qua ratione huiusmodi morbus nō
solum requirit magna remedia, sed etiam quę celeriter su-
currant parti affectae, nam quę celeritatem desiderant cele-
riter sunt per agenda ex Hipoc. 1. acutor. 8. remedia enim si-
cuticūm morbis contendunt magnitudine, sic etiam cum ce-
leritate contendere debent (quę occasio dicitur & præceps
ab Hippocrate) & in pleuritide non solum intendimus reuele-
re, sed etiam id quod iam est flucxum euacuare minor prob.
quia vena vasilica lateris affecti maiorem seruat restitudinem
cum parte affecta & maiorem consensum, tum ratione recti-
positus partis, tum ratione venarum: ergo cum sufficiens sit
distantia & contrarietas inter latus affectum & brachium, &
maxima sit vasorum cōmunicio celeriter, & efficaciter reue-
let illius venae seccio, & flucxum humorum euacuavit.

His sic propositis ad argumenta contraria satisfatiamus, *Resp.*
& ad primū de vulnere existente in una thoracis parte nega-
mus, quod ex altera sanguis sit mittendus, quia nulla serua-
tur rectudo, vt dicimus, nisi ex pede & non quia magis cō-
citaretur flucxus si ex eodem brachio mitteremus sanguinē
sed quia in isto casu solum requiritur ex quisita & sola revul-

sto & latus propter fluxionem vulnus est inanitum, quia si plenum esset cum dolore & inflammatione mitterem certe ex eodem & in hoc sensu seruatur paritas inter pluriudem, & hunc casum non vero, ut proponitur.

Ad 2. quod probat tandem esse rationem precautionis & curationis negamus hoc, quia licet eisdem remediis curare, & preservare debeamus, no tamen eis eodem modo aplicatis, quia proter maiorem necessitatem, aut cu maiori celeritate, aut in maiori quantitate, aut ex proximiori loco sunt exercenda, & licet eadem causa, que incepit causat effectum, ipsa cotinuata cu foucat nihilominus ead diuerso modo indicat quando incipit, qua quando iam est fluxa, quia primo solum ex postulat reuulsionem, postea tamen deriuationem, & sic intelligendus est Gal. lib. de sanguinis missione 19. quando asserit quibus vero pars quepi, nisi prius vacuati fuerint praecipue infestatur, aut eque ex quavis parte euacuationem moliri oportet, sed perinde ac in iis que i laborare incipiunt, &c. Id est veluti in morbo particulari presente est necessarium, quod eligatur vena que rectitudinem seruet cum affectu sic, & in precautione affectus particularis, quod diuersum est in morbis vniuersalibus in quibus nulla requisita est electio no vero, vt inuentor vult cum Argenterio lib. artis medicæ com. 3. eadē venas scindendas esse in precautione & curatione, quod falsum esse ex eodē Gal. patet in fine cap. propositū, ubi omnia que proposuerat resumens, ait communis igitur in his omnibus, qui vere inuenire ad sanguinis missione veniunt hæc ratio est siquidē praecipue infirmā aliquā partē habent in quā que coaceruatur plenitudo decumbat reuulsorie, ut euacuemus, si vero tale nihil sit unde cunque magis placebit, & quod hæc sit vera ratio confirmatur ex eo, quod in morbo imminentis solum est causa parata fluere cui reuulsio distatissima debetur, ut ad aliā partē natura cōsuetudinē assummat, tam enī in præsenti morbo est causa fluere parata, & iam fluēs & fluxa ex quibus diuersis causæ motionibus variæ de summittur indicationes quibus occursum est, ergo diuerso modo in precautione, & curatione est procedendum, & sic est Galenus intelligendus in presenti, ut censem acutissimus Vei

galibro artis medicæ 95. & Fuis in præsenti Petrus de
Peramato deuacuād ratione 28. & inter omnes prestatissime
magister meus doctissimus Rodericus de Soria super Auic.

Ad 3. quod probat ex Gal. longissime a parte inflammata
aduocādos esse humores respōdetur, quod Galenus est intel-
ligendus seruatis seruandis hoc est quā longissime elegi po-
ssit dum modo seruetur rectitudo & omnibus ex postulantia-
bus indicationibus correspondeat, & quia quando vrget af-
fectus, & præsens est, non præstat indutias expectādi, eligen-
da est vena, quæ cicius & directius locū respiciat, & hæc sem-
per distantissima non est, licet semper debeat esse contraria,
& ideo in ipso 13. meth. vbi sententiā hæc Gal. affert eam ex é-
pli declarat siquidē in inflammationibus oculorū laudat fle-
botoniā ex cephalica & in pectori ex vasilica, quæ magis di-
etas affectas partes respiciunt, & quando absolute ex distantis-
sima docet, est in preseruatione, vt cōstat ex ipso 2. de natu-
ra humana tex. 9. in ex opositione illius Hip. tex. & lib. artis
medicæ 99. cum de remedis preseruatibis agat, nō vero mor-
bo existente presente, & non est quod dicas in illis exépli-
de consistente morbo esse intelligendū, nam ipsi Gal. est cō-
traria responsio ista siquidē de principiis morborū loquitur,
in quo tēpore sanguinis missio locū habet, nam in choanti-
bus morbis flebotamia exercetur, & ad rebelendum præci-
pue, vt ipse in toto illo capite scitato docet.

Ad 4. vero respondemus concedendo maiorem, quod si
licet in principio inflammationis sit fluxio & quod sit revulsi-
exercenda, quod ex eodem brachio non fiat negamus & ad
probationem maiorem damus, negamus tamen minorem,
quia sanguinis missio ex proprio latere aduocat humores a
centro ad circumferentiam & ab inferioribus ad superiora,
qui sunt contrarii motus.

Ad 5. & ultimum respondeatur concedendo, quod si ori-
go fluxionis cognoscatur, semper ad ipsam est reuocandus
humor dū modo morbus nō tantū vrgeat, vt relieto regimi-
ne causæ ad ipsum accedamus tamē quod semper sit vena ca-
ba origopléuritidis negamus. Ut supra in 4. notabili probabi-
mus & licet cōtingat, quod exquisitū erit, etiā sanguinis mis-

sio ex eodē latere ad originē fluxionis adūocat humorēs nā
si a capite proueniat talis euacuatio ab inferioribus ad supe-
riora reuelit si ab externis ad exteriora aduocat illos tādē si a
vena caua iterū ad ipsam aduocat humores prius quā ad bra-
chiū per veniāt, quia tan vna, quam altera acxiliaris vena ab
vno trunko scilicet, vena caua equaliter vifurcātur, & secun-
dū hoc tan vna, quam altera, ex ipsa vena caba deponit san-
guinem & reuelit ad illam tamē acxiliaris eiusdē lateris pre-
ter hoc habet aliam cōmunicationē factam per ramum cō-
municatū oscula osculis per anasthomosim cum ramulis ve-
næ, sine cōiuge cuius ratione nō solum euacuat ex vena caua
reuelendo, sed ex proximis partibus deriuando & euacuan-
do, quia eadē pars est remota propter vifurcationē factam
in vena caua & proxima propter cōmunicationem factam
in altero ramo dicto, vt latius ex anathome cōstat unde pa-
tet, quod ratio illa, quod vna & eadē pars nō potest esse pro-
xima & remota nullā habet vim quando pars habet diuersas
cōmunicationes cū affecta parte, vt ista vena dicta, nā si vna
tantum esset cōmunicatio bene probabat, ergo semper ad
originem fluctionis, vt ipse ait & nos cōcedimus aduocādus
est & aduocatur humor missio sanguine ex eodē latere, quod
semper est & debet esse perpetuum.

Loci tamen Hipocratis & Galeni pro se aducti nihil con-
tra nos probant, vt ex dictis patet nam locum autoris de na-
tura humana Galenus ipse explicat, quod de precautione in-
telligatur, quod affert ex Galeno in 13. meth. cōcēdimus, sed
diuersa estratio in inflāmationibus exterioribus quē induitas
dant expectādi quam in interioribus quē semper vrgēt, pre-
ter quā quod in exterioribus nō est cōtrarietas ab intro ad ex-
tra, & sic est necessaria quē sit ad lōginqua Aetii tex. ex Ar-
chigenis sententia est nō vero ex sua dictum Celsi in exteriori-
bus intelligitur, quod ex Auicena affert in probamus tan-
quam falsum id veritatis in veniādi desiderio proposui non
contradicendi animo præcipue mihi amicissimo quē alias
summopere dilligo, sed licet amicissimus magis amica veri-
tas quē in retā grāuisūmopere est amplectēda.



