

32.5%. Los dientes que mas habitualmente aparecen retenidos son los terceros molares y los caninos superiores, presentándose incluidos el 57.1%, semiincluidos 42.3% y heterotopicos un 0.5%. Los motivos por los que consultan nuestros pacientes son: pericoronaritis 28.7%, motivos ortodonticos 28.4%, hallazgo casual 18.3%, periodontitis 6.6%, dolor 5.6%, quistes foliculares 3.6%, motivos prostodonticos 3.0%, cefaleas 2.0%, caries 1.0%, neuralgias 1.0%, absceso 0.5%, anestesia 0.3%, infección 0.3%, movilidad dentaria 0.3%, osteitis 0.3% y sinusitis 0.3%.

### CONCLUSIONES

El motivo habitual por el que acuden los pacientes en relación con dientes retenidos es la pericoronaritis siendo más frecuente en los dientes semiincluidos que en los incluidos.

### NUEVO COLUTORIO PARA LESIONES ULCERADAS AGUDAS DOLOROSAS DE LA CAVIDAD ORAL

Rodríguez Nulez I., Blanco Carrión., Gándara Rey JR., Beiro R., García García A.  
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Las lesiones ulceradas agudas son la patología más frecuente de la cavidad oral. Todas ellas tienen en común una característica clínica fundamental: el dolor. La mayor parte de ellas no tienen un tratamiento específico, tanto paliativo como curativo. Por otra parte, el dolor que aparece en estas lesiones suele ser motivado por infecciones secundarias por los gérmenes saprofitos de la boca que cohabitan en condiciones normales. Por todo ello, y ante la inexistencia de un tratamiento comercializado efectivo para estos casos, presentamos una formula magistral en forma de colutorio que alivie su clínica y disminuya en tiempo de evolución.

### PREVALENCIA DE LEUCOPLASIA ORAL EN PACIENTES PSIQUIATRICOS INSTITUCIONALIZADOS

Bullón P., Velasco E., Machuca G., Martínez-Sahuquillo A., Ríos V.  
FACULTAD DE ODONTOLOGIA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La mayoría de los estudios para determinar las condiciones de salud oral en una población determinada, han

consistido en la valoración de la caries dental o de la enfermedad periodontal. Sin embargo, pocos trabajos hacen referencia a la prevalencia de enfermedades de la mucosa oral.

El estudio de lesiones específicas de la mucosa oral es importante realizarlo en poblaciones especiales para determinar la existencia de grupos de alto riesgo, como puede ser la evaluación de lesiones precancerosas en enfermos mentales crónicos hospitalizados.

El objetivo del presente trabajo es describir la prevalencia de leucoplasia oral en una población de pacientes psiquiatricos institucionalizados y su posible relación con factores demográficos (edad, sexo, tiempo de hospitalización), clínicos (tratamiento psicofarmacológico, diagnóstico psiquiatrico) y habito de fumar tabaco.

### MATERIAL Y METODO

El estudio fue realizado en el Hospital Psiquiatrico de Miraflores de Sevilla. Se examinaron 565 pacientes adultos. El criterio diagnóstico de leucoplasias se estableció según la OMS. La mucosa oral fue explorada siguiendo los criterios de Axell y Salonen. Las diferencias estadísticas fueron establecidas según el test de la Chi-cuadrado.

### RESULTADOS

Lesiones de leucoplasia oral se encontraron en 43 pacientes (7,6%). La prevalencia de leucoplasia fue de 11,8% (n=41) en los hombres y 0,9% (n=2) en las mujeres. Esta diferencia era significativa (p=0,0005). La edad media de los pacientes con leucoplasia fue de 57,9 años.

La valoración de la historia médica revelaba que el trastorno más frecuente era la leucoplasia (72,0%). La media de psicofármacos era de especialmente fenotiazinas (79,0%). El tiempo medio de hospitalización era de años. Todos los pacientes con leucoplasia (100%) era fumadores, con una media superior a los 20 cigarrillos diarios. Esta diferencia era significativa (p=0.0005).

La localización más frecuente de las lesiones de leucoplasia fue retrocomisural (74,4%).

Finalmente, se discuten los resultados con los hallazgos de leucoplasia oral descritos en otros grupos especiales de pacientes y en la población general.