

Tabla I
Características sociodemográficas de los progenitores de los tres grupos

GRUPO	EDAD MEDIA	D.T.	PAD.	MAD.	URB.	RUR.
ASMATICOS	38,62	6,51	3	52	24	31
ENF. CRON.	38,37	7,58	6	26	14	18
SANOS	38,95	7,5	8	74	61	21

Abreviaturas: ENF. CRON. (progenitores de niños con enfermedades crónicas); D.T. (desviación típica de la edad media); PAD. (padres que contestaron los cuestionarios); MAD. (madres que contestaron los cuestionarios); URB. (residencia en la capital); RUR. (residencia en un pueblo).

Tabla II
Distribución de los niños del grupo 2
(enfermedades crónicas)

ENFERMEDADES CRONICAS	N.º NIÑOS
DIABETES	16
HIPOTIROIDISMO	4
FENILCETONURIA	3
CELIAQUIA	2
HEMOFILIA	2
ARRITMIA	2
ARTRITIS REUMATOIDE	1
HIPERPLASIA SUPRARRENAL	1

Tabla III
Anova Oneway (STAI)

STAI	F	PROBAB.	GRUPOS
AE	7.9788	.0005	G1>G3
AR	2.7179	.0694	

Nota 1: G1 (asma); G2 (enf. crónicas); G3 (sanos).

Tabla IV
Anova One-way (BECK)

BECK	F	PROBAB.	GRUPOS
B1	.3072	.7360	
B2	1.1930	.3063	
B3	1.4175	.2456	
B4	1.0754	.3438	
B5	.1044	.9010	
B6	1.7040	.1855	
B7	.0265	.9738	
B8	.7683	.4657	
B9	1.2507	.2894	
B10	.4766	.6219	
B11	.5338	.5875	
B12	.0802	.9230	
B13	.5580	.5736	
B14	3.4157	.0355	G1>G2
B15	1.2951	.2770	
B16	.3753	.6877	
B17	2.9801	.0539	(G1>G3)
B18	.0974	.9072	
B19	.996	.9052	
B20	1.8202	.1657	
B21	.2105	.8104	
B TOTAL	.7169	.4900	

Nota 1: G1 (asma); G2 (enf. crónicas); G3 (sanos).

Nota 2: B1 (estado de ánimo); B2 (pesimismo); B3 (sentimientos de fracaso); B4 (insatisfacción); B5 (sentimientos de culpa); B6 (castigo); B7 (odio a sí mismo); B8 (autoacusación); B9 (suicidio); B10 (llanto); B11 (irritabilidad); B12 (aislamiento); B13 (indecisión); B14 (imagen corporal); B15 (trabajo); B16 (sueño); B17 (cansancio); B18 (apetito); B19 (peso); B20 (hipocondría); B21 (libido); B Total (puntuación total).

Tabla V
Anova Oneway (G.H.Q.)

G.H.Q.	F	PROBAB.	GRUPOS
A	1.1326	.3249	
B	1.1984	.3046	
C	.7113	.4927	
D	3.4837	.0332	G2>G3
TOTAL	1.7964	.1695	

Nota 1: A (somatizaciones); B (ansiedad); C (disfunción social); D (depresión); T (problemas de salud totales).

Nota 2: G1 (asma); G2 (enf. crónicas); G3 (sanos).

Tabla VI
Valor de la t de Student y grado
de significación (p) de la Escala de Beck

BECK	G1-G2 (t/p)	G2-G3 (t/p)	G1-G3 (t/p)
B1	-0.58/.028	0.37/.35	-0.27/.39
B2	0.11/.45	1.1/.13	1.32/.09
B3	2.09/.019*	-1.39/.08	1.03/.15
B4	0.62/.26	0.57/.28	1.43/.07
B5	0.69/.24	-0.63/.26	0.14/.44
B6	1.6/.057	-0.55/.29	1.51/.06
B7	0.04/.48	-0.07/.47	-0.03/.48
B8	1.08/.14	-0.33/.37	0.49/.16
B9	-0.77/.22	0.93/.18	0.22/.41
B10	-0.71/.24	-0.11/.45	-0.93/.17
B11	-0.05/.47	0.78/.21	0.88/.19
B12	-0.04/.48	-0.2/.42	-0.28/.38
B13	-0.11/.45	1.09/.13	1.04/.15
B14	3.02/.001***	-1.93/.028*	1.42/.07
B15	0.91/.18	0.39/.34	1.68/.047*
B16	0.98/.16	-1.04/.14	-0.15/.48
B17	0.92/.18	1.45/.07	2.64/.005**
B18	-0.26/.39	0.12/.45	-0.18/.47
B19	1.1/.13	-0.31/.37	1/.15
B20	2.11/.019*	-1.52/.06	0.8/.21
B21	-0.26/.38	0.02/.49	-0.37/.35
B TOTAL	1.27/.1	-0.32/.37	1.16/.12

Nota 1: G1 (asma); G2 (enf. crónicas); G3 (sanos).

Nota 2: * (p<.05); ** (p<.01); *** (p<.005).

Tabla VII
Medias (\bar{X}) y desviaciones
típicas (S) del GHQ

G.H.Q.	G1 (\bar{X}/S)	G2 (\bar{X}/S)	G3 (\bar{X}/S)
A	1.7/1.9	1.34/1.6	1.14/1.8
B	1.87/2.01	1.78/2.2	1.39/1.8
C	0.85/1.2	0.75/1.1	0.57/1.1
D	0.41/1.04	0.9/1.6	0.4/0.8
TOTAL	4.96/4.3	4.78/4.8	3.47/4.5

Nota 1: A (somatizaciones); B (ansiedad); C (disfunción social); D (depresión); T (problemas de salud totales).

Nota 2: G1 (asma); G2 (enf. crónicas); G3 (sanos).

Tabla VIII
Valor de la t de Student (t)
y grado de significación (p) del GHQ

G.H.Q.	G1-G2 (t/p)	G2-G3 (t/p)	G1-G3 (t/p)
A	0.89/.18	0.54/.24	1.73/.043*
B	0.19/.42	0.94/.17	1.43/.75
C	0.39/.34	0.74/.23	1.38/.08
D	-1.49/.07	1.63/.55	0.1/.46
TOTAL	0.18/.42	1.35/.08	1.92/.02*

Nota 1: A (somatizaciones); B (ansiedad); C (disfunción social); D (depresión); T (problemas de salud totales).

Nota 2: * (p < .05).