

Material estudiado.

Cádiz. Castellar de la Frontera, Colinas de Almoraima, 25.V.1957, *Brinton-Lee* (SEV 82608). Tarifa, Sierra de Ojén, 30.III.1980, *Amor & al.* (SEV 69108). Facinas, 28.IV.1974, *Brinton-Lee* (SEV 86609; 89675).

C. Romero Zarco

188. *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 614 (1821).

Ervum hirsutum L., *Sp. Pl.* 738 (1753).

Especie de amplia distribución geográfica que, según las citas de GUINEA (1953, *Veas y Arvejas españolas* 154) y el material del herbario de la Facultad de Biología de Sevilla (SEV) se distribuye por el N, Centro y sobre todo por el E de la Península Ibérica, no conociéndose ninguna cita precedente para Andalucía occidental.

Se ha encontrado en dos enclaves ácidos de la Serranía de Grazalema (Cádiz, Grazalema, Cerro del Montón, TF 8574, 900 m.s.m., 14.V.1983, *Aparicio, Blázquez & García Rowe*, SEV 102585; Loma de la Mojonera, TF 8773, 1300 m.s.m., 29.IV.1983, *Aparicio & Silvestre*, SEV 102585). Esta población se relaciona corológicamente con las que existen en otros lugares descalcificados de las sierras de Málaga.

A. Aparicio & C. Romero Zarco

189. *Trifolium leucanthum* Bieb., *Fl. Taur.-Cauc.* 2: 214 (1808).

Taxón que se distribuye por la Región Mediterránea y Asia Menor. Fue citado por primera vez para la Península Ibérica en Portugal por SAMPAIO (1946, *Fl. Port.* 291) de Bragança, localidad posteriormente repetida por AMARAL FRANCO (1971, *Nova Fl. Port.* 374) y FERNANDES & QUEIRÓS (1978, *Bol. Soc. Brot.*, 2ª ser., 55: 100). Del territorio español se conoce de Zamora (VALLE TENDERO, 1981, *Lagascalia* 10: 85), Salamanca (LAÍN Z, 1954, *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 13: 482; ANGULO, SÁNCHEZ DE RIVERA & GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1970, *Bol. Soc. Brot.*, 2ª ser., 44: 14; ZOHARY, 1972, *Candollea* 27: 258), y recientemente ha sido citada de Granada por VALLE TENDERO (l.c.).

Se encuentra en la provincia de Cádiz (Benaocaz: Arroyo del Pajarito, Rancho Las Colmenillas, TF 8065, 30.V.1984, *Aparicio & Silvestre*, SEV F;