

**223. *Juncus sphaerocarpus* Nees in Funck, *Flora (Regensb.)* 1: 521 (1818).**

Especie poco frecuente en la Península Ibérica, a menudo confundida con *J. bufonius* L., del que se separa claramente por el menor tamaño de sus flores (que no llegan a 4 mm.) además de por su cápsula globosa, y con *J. tenageia* Ehrh. ex L. fil., del que se distingue principalmente por sus vainas foliares no auriculadas así como por sus tépalos carentes de bandas pardas a los lados de la banda verde central y por sus cápsulas claramente más cortas que el perigonio. Fué señalada por BARRAS (1897, *Actas Soc. Esp. Hist. Nat.* 26: 261) entre Dos Hermanas y Sevilla sin que se haya encontrado el pliego testigo ni que, al parecer, haya sido citada con posterioridad en Andalucía Occidental. Por tanto, parece oportuno destacar que se ha recolectado en Sevilla (entre Morón y Puebla de Cazalla, 29.IV.1977, Ruíz de Clavijo SEV 32024; entre Morón y Villanueva de San Juan, río Corbones, 29.IV.1977, Ruíz de Clavijo SEV 36718).

M. C. Fernández-Carvajal

**224. *Carex mairii* Coss. & Germ., *Obs. Pl. Crit.* 18 (1840).**

Frecuente en la Serranía de Ronda, se ha localizado en las zonas húmedas de la Sierra de Lijar, donde es bastante escasa (Cádiz, Algodonales, Sierra de Lijar, 31.V.1979, Aparicio, Cabezudo & Riosa, SEV 59690). Se trata de la primera cita para Andalucía Occidental.

A. Aparicio & S. Silvestre

**225. *Carex remota* L., *Fl. Angl.* 24 (1754).**

De acuerdo con los datos bibliográficos y material de herbario consultados, esta especie se conocía únicamente de la mitad septentrional de la Península Ibérica, siendo Jerte (Cáceres) (*Amich, Rico & Sánchez*, MA 236988, MAF 112022 y SEV 66734), la localidad más próxima a Andalucía Occidental.

Se trata de una planta rara en esta región, de donde se cita por primera vez, encontrándose restringida a las zonas húmedas de la Sierra de Aracena