

**172. *Polygonum bellardii* All., *Fl. Ped.* 1: 207 (1785).**

Especie anual perteneciente a la sect. *Polygonum* (=Sect. *Avicularia* Meissn.) y formando parte del complejo *P. aviculare* L., con el que frecuentemente se ha confundido. Sin embargo, *P. bellardii* All. se diferencia claramente por su menor densidad foliar, inflorescencia en racimos espiciformes laxos con brácteas tan largas o más cortas que los entrenudos, y sobre todo por su periantio fructífero cerrado apicalmente y con nerviación reticulada muy marcada.

Se ha recolectado en varias localidades (Cádiz, Alcalá de los Gazules, 5.V.1973, *Silvestre*, SEV 14689; Espera, 2.VI.1975, *Silvestre*, SEV 20797; El Bosque, 21.VI.1982, *Aparicio, García & Silvestre*, SEV 114521; Córdoba, entre Torrecampo y San Benito, 27.V.1982, *Devesa & García*, SEV 96430; Sevilla, Los Palacios, 5.V.1972, *Domínguez & Romero*, SEV 10170), lo que constituye una primera cita para Andalucía Occidental.

La población de El Bosque (Cádiz) presenta individuos muy característicos que se separan claramente de las restantes por tener muy pocas hojas o incluso ser afilos, por sus ramas laterales profusamente ramificadas y de aspecto flexible, inflorescencia sin brácteas o con brácteas muy reducidas y casi lineares, y aquenios de 2-2,5 (-3) mm. Se estima deben separarse como variedad independiente, que se describe a continuación:

***Polygonum bellardii* All. var. *densa* Pastor & Aparicio, var. *nova***

A varietate typica differt caule ramossisimo, cum foliis parvissimus et caducis, cymis paucifloribus laxissimus, achaenibus minoribus.

*Typus.* Cádiz, El Bosque, Salinas de Hertales, ubi die 21.VI.1982, *Aparicio, García & Silvestre*, legit (SEV 114521, *holotypus*).

Planta anual. Tallo de hasta 95 cm., profusamente ramificado. Hojas escasas y caducas, con limbo de hasta 3 (-3,5) x 1 cm., estrechamente elíptico a lanceolado, agudo. Flores en cimas paucifloras afilas o con pequeñas brácteas casi lineares, reunidas en espigas terminales y laterales muy laxas. Periantio de 2-3,5 (-4) mm., persistente al fructificar y solapándose las piezas apicalmente. Aquenios de 2-2,5 (-3) mm., incluidos en el periantio, finamente papilosos.

*J. Pastor & A. Aparicio*